DOI: 10.3969/j.issn.1671-9638.2017.03.001

· 论 著 ·

产气肠杆菌携带基因 bla_{NDM-1} 的质粒特征及基因环境分析

肖伟强, 许青霞, 李铁鹏, 王智中, 潘 军, 姚新伟, 常彦敏, 孙明月

(郑州大学附属肿瘤医院, 河南 郑州 450000)

[摘要] **目的** 了解产气肠杆菌携带 bla_{NDM-1} 质粒的转移性、复制子分型及周围环境。**方法** 产气肠杆菌 HN-NDM0711 为实验菌株, 利用接合实验研究其质粒的转移性, 对接合子进行稳定性试验, 采用质粒复制子分型法对质粒进行分型, 利用染色体步移技术对基因 bla_{NDM-1} 上下游进行测序, 使用 BLASTN 和 BLASTP 对基因组序列进行比对, 使用 Vector NTI 11.5.1 注释并生成序列管道图, 序列通过软件 BankIt 递交至 Genbank。**结果** 产气肠杆菌 HN-NDM0711 接合实验阳性, 阳性接合子稳定传代 4 d 后, 所有克隆株对亚胺培南和美罗培南的最低抑菌浓度 (MIC) 均未发生变化, 基因 bla_{NDM-1} 均为阳性。质粒复制子为 IncA/C 型; 基因 bla_{NDM-1} 位于不常见的插入序列 ISA-ba14 和 IS91 之间, 在 bla_{NDM-1} 的上游出现一个 Tn3 转座子和 I 型整合子, 整合子上含有一个由庞大镶嵌序列构成的少见耐药基因盒。**结论** IncA/C 型质粒 pHN-NDM0711 携带基因 bla_{NDM-1} 及耐药基因盒, 可能源于不同抗菌药物选择压力下的基因重组, 建议严格控制临床、工业和农业抗菌药物的使用, 从源头上减少此类细菌的产生。

[关键词] 产气肠杆菌; NDM-1; 接合实验; 质粒复制子分型; β -内酰胺酶

[中图分类号] R378.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-9638(2017)03-0195-04

Characteristics and bla_{NDM-1} genetic environment of plasmid from *Enterobacter aerogenes*

XIAO Wei-qiang, XU Qing-xia, LI Tie-peng, WANG Zhi-zhong, PAN Jun, YAO Xin-wei, CHANG Yan-min, SUN Ming-yue (Affiliated Cancer Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, China)

[Abstract] **Objective** To study plasmid-mediated transfer, plasmid replicon typing, and genetic environment of bla_{NDM-1} gene in *Enterobacter aerogenes* (*E. aerogenes*). **Methods** *E. aerogenes* HN-NDM0711 was used as the subject of this research, the transferable properties of plasmid were analyzed by conjugation testing, conjugant was performed stability testing, plasmid type was determined by PCR-based replicon typing (PBRT), downstream and upstream of bla_{NDM-1} were sequenced using chromosome walking method, genetic context was analyzed by BLASTN and BLASTP, as well as annotated using Vector NTI 11.5.1 software, sequence pipeline graph was made, the sequence was submitted to Genbank through software BankIt. **Results** The conjugation testing of *E. aerogenes* pHN-NDM0711 was positive, after positive conjugant was conducted 4-day passage, minimal inhibitory concentrations (MICs) of imipenem and meropenem to all the cloned strains didn't change, bla_{NDM-1} were all positive. The replicon type was IncA/C; bla_{NDM-1} gene was localized between ISAba14 and IS91, at upstream of the bla_{NDM-1} , class 1 integron and Tn3 transposon were identified, class 1 integron contained a new mosaic structure of a drug-resistant resistance gene cassette. **Conclusion** *E. aerogenes* pHN-NDM0711, bearing bla_{NDM-1} gene in IncA/C plasmid, derived from gene recombination under different antimicrobial selection pressure. Antimicrobial use in clinical, industrial and agricultural area should be strictly controlled, so as to reduce the emergence of such bacteria.

[收稿日期] 2016-05-05

[基金项目] 河南省卫生厅科技攻关项目(201503192)

[作者简介] 肖伟强(1975-),男(汉族),河南省郑州市人,主管技师,主要从事细菌耐药机制研究。

[通信作者] 许青霞 E-mail: xiaowq126@126.com

[Key words] *Enterobacter aerogenes*; NDM-1; conjugation testing; plasmid replicon typing; β -lactamase

[Chin J Infect Control, 2017, 16(3): 195 - 198]

耐碳青霉烯类革兰阴性杆菌的出现和传播成为全球公共健康的重大威胁,其中获得性金属类 β -内酰胺酶,如新德里金属 β -内酰胺酶基因(New Delhi metallo- β -lactamase-1, NDM-1)也可造成碳青霉烯类抗生素耐药^[1-2]。研究^[2-3]表明,基因 NDM-1 多发现于大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌等细菌中,常存在于 IncA/C、IncF、IncFII 等不同类型的质粒上,该基因周围存在不同的基因环境。在前期的实验中,本课题组发现了 3 株因交叉感染而引起传播的产气肠杆菌^[4],均表现为多重耐药,金属酶表型实验和聚合酶链反应(PCR)方法均证实携带基因 NDM-1,脉冲场凝胶电泳实验证实为同一型别,但尚不清楚其携带 *bla*_{NDM-1} 质粒的转移性、复制子分型及基因环境等特征,且较少文献报道产气肠杆菌携带 *bla*_{NDM-1} 的基因周围环境,故对此进行研究,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 菌株及来源 本院有 3 株具有同源性的产气肠杆菌(均携带 NDM-1 基因)引起的交叉感染,取其中 1 株产气肠杆菌 0711(HN-NDM0711),该菌株仅对多粘菌素、左氧氟沙星和环丙沙星敏感,对碳青霉烯类、头孢菌素类、喹诺酮类、单环 β -内酰胺类等抗菌药物全部耐药,菌株及患者信息见文献^[4]。质控菌株为大肠埃希菌 ATCC 25922,耐叠氮钠大肠埃希菌 J53 由河南农业大学杜向党教授提供。

1.2 仪器与试剂 全自动细菌鉴定仪 Phenix-100 为美国 BD 公司产品,PCR 扩增仪购自美国 ABI 公司,凝胶成像系统为美国 Bio-Rad 公司产品。质粒 DNA 提取试剂盒购自德国 QIAGEN 公司,叠氮钠和美罗培南均购自 Sigma 公司,DNA Marker 和 2× PCR Premix 购自大连宝生物公司,引物合成及测序由上海生工技术有限公司完成。

1.3 接合试验 产气肠杆菌 HN-NDM0711 为供体菌,大肠埃希菌 J53 为受体菌,取两种细菌对数生长期菌液各 1 mL,加入 100 mL 的营养肉汤中,37℃ 静置过夜,取 200 μ L 均匀涂布于筛选平板上(含 100 μ g/mL 叠氮钠和 2 μ g/mL 美罗培南),培养 12~24 h,并用琼脂稀释法测定接合子的亚胺培南和美罗培南最小抑菌浓度(minimal inhibitory concentration,

MIC)。试剂盒提取接合子质粒 DNA,命名为 pHN-NDM0711,PCR 方法检测 *bla*_{NDM-1} 基因^[4]。

1.4 接合子稳定性试验^[5] 挑取阳性接合子接种于不含抗菌药物的 LB 肉汤培养基中,37℃ 300 r/min 震荡过夜,使用 LB 肉汤培养基稀释至 10³ CFU/mL,继续震荡过夜,用同样方法连续稀释震荡培养 4 d,分别在第 2、3 和 4 天取 0.1 mL 的培养液,用 0.9 mL 的生理盐水稀释,倾注于营养琼脂平板,37℃ 培养过夜,挑 10 个菌落(共 30 个菌落)测定亚胺培南和美罗培南的 MIC,并提取质粒 DNA 检测 *bla*_{NDM-1} 基因。

1.5 质粒复制子分型(PCR-based replicon typing, PBRT 分型) 提取的质粒 DNA 作为模板,利用 18 对引物,使用 5 次多重 PCR 和 3 次单一 PCR 扩增 FIA、FIB、FIC、HI1、HI2、I1-I γ 、L/M、N、P、W、T、A/C、K、B/O、X、Y、F 和 FIIA 等质粒复制子类型,PCR 反应条件和结果判读均参照相关文献^[6]。

1.6 *bla*_{NDM-1} 基因周围序列测序 提取的质粒 DNA 送交上海生工项目部,采用 DNA 步移技术对目的基因 *bla*_{NDM-1} 周围序列测序,*bla*_{NDM-1} 基因号: KJ577744^[4]。

1.7 DNA 序列注释和递交 使用 GeneMark 软件进行基因预测,并通过软件 BLASTN 和软件 BLASTP 双向比对基因的相似性,使用 Vector NTI 11.5.1 注释并生成序列管道图,序列通过软件 BankIt 递交到 Genbank 获得序列号为 KU764665。

2 结果

2.1 接合实验和 *bla*_{NDM-1} 基因扩增结果 筛选平板培养 12 h 有细小菌落,24 h 有明显单个菌落,鉴定为大肠埃希菌,测定亚胺培南和美罗培南的 MIC 分别为 4、8 μ g/mL,*bla*_{NDM-1} 基因检测阳性。

2.2 接合子稳定性试验结果 阳性接合子稳定传代 4 d 后,所有克隆株对亚胺培南和美罗培南的 MIC 均未发生变化,*bla*_{NDM-1} 均为阳性。

2.3 PBRT 分型结果 使用 A/C 的正反向引物扩增,在 400 bp 附近(目的基因为 465 bp)处有清晰条带,证明供体菌和阳性接合子的质粒均为 IncA/C 型。见图 1。

M:DL1000 DNA Marker,1:阳性接合子,2:产气肠杆菌 0711

图1 阳性接合子和产气肠杆菌0711质粒的PBRT分型电泳图

Figure 1 PBRT map of positive conjugant and *E. aerogenes* 0711 plasmid

2.4 基因环境分析 测序获得一段 18 621 bp 的 DNA 序列,共包含 17 个核心编码序列(coding sequences,CDS)。bla_{NDM-1} 位于 IS91 和 ISAba14 之间,下游为 ISAba125,上游为 bleo, trpF 和 dsbC;紧接此序列是 I 型整合子,除携带实现其自身功能的整合酶基因(int I1)外,还携带由一个由 dfrA14、arr-2、cm1A7、blaOXA-10、aadA1、qacEdelta1、sul I 构成的庞大耐药基因盒。在 I 型整合子的上游,含有一个 Tn3 的转座子,同时携带有实现其自身功能的转座酶和解旋酶。比对发现序列上游(1~13 099 bp)与来自于肺炎克雷伯 NDM-1 基因阴性的 pHM881QN(LC055503)和 IncA/C-LS6(JX442976)具有高度相似性(>99%),而下游携带 bla_{NDM-1} (13 100~18 621 bp)序列与来自鲍曼不动杆菌 GB661 的质粒(KP009590)具有高度的相似性(>99%),但方向相反。见图 2。

注:箭头代表转录方向,灰色表示一致性序列。基因名称、编码蛋白分别为 Tn3 tnpA(Tn3 转座酶)、Tn3 tnpR(Tn3 解旋酶)、Int I1(Int I 型整合酶)、dfrA14(二氢叶酸还原酶,磺胺类增效剂耐药)、arr-2(利福平 ADP-核糖基化转移酶)、cm1A7(氯霉素耐药蛋白)、blaOXA-10(β-内酰胺酶)、aadA1(氨基糖苷乙酰转移酶)、qacEdelta1(季铵盐类外排泵)、sul I(二氢蝶酸合成酶,磺胺类耐药)、IS91(插入序列元件)、dsbC(二硫键异构酶)、trpF[N-(5'-磷酸核糖基)邻氨基苯甲酸异构酶]、bleo(博来霉素耐药蛋白)、NDM-1(金属 β-内酰胺酶)、aphA6(氨基糖苷类 3-磷酸转移酶)、ISAba14(插入序列元件)

图2 bla_{NDM-1}的基因环境示意图

Figure 2 Diagram of genetic environment of bla_{NDM-1}

3 讨论

本文接合实验及 PBRT 分型表明,产气肠杆菌携带 bla_{NDM-1} 基因的质粒为可转移性 IncA/C 质粒。bla_{NDM-1} 位于 IS91 和 ISAba14 之间,为一段保守的序列^[7-8],IncA/C 型质粒是携带 bla_{NDM-1} 的重要载体^[2-3, 8],该质粒能介导多重耐药,其宿主广泛,普遍存在于人和家禽的肠道菌群中,IncA/C 型质粒也是携带超广谱 β-内酰胺酶和 Ampc 酶等碳青霉烯酶的重要载体。近几年引起人们的关注,IncA/C 型质粒

上常存在可转移性的基因元件,如转座子、I 型整合子和 ISCRs 类插入序列,使其携带耐药基因易发生转移^[8-9]。

接合子稳定性试验表明,阳性接合子的多重耐药特征可稳定传代,符合 IncA/C 质粒的特征,与文献^[2, 7-8]报道一致。文献^[10]报道,来自鲍曼不动杆菌产 NDM-1 的质粒导入大肠埃希菌 J53 后,接合子质粒不稳定,容易丢失,因此,转移性 IncA/C 型质粒引起的潜在传播方式应引起更多的关注。

基因测序获得了一段 18 621 bp 的序列,比对发现序列上游(1~13 099 bp)与来自于肺炎克雷伯

NDM-1 基因阴性的 pHM881QN(LC055503)和 IncA/C-LS6(JX442976)具有高度相似性(>99%),而下游携带 *bla*_{NDM-1} (13 100~18 621 bp)序列与来自鲍曼不动杆菌 GB661 的质粒(KP009590)具有高度的相似性(>99%),但方向相反;进一步分析发现除 *bla*_{NDM-1} 上下游保守序列外,还存在 ISAba14 及 IS91,与通常插入序列(如 ISCR1^[11] 或 IS26^[12])不同,推测类似 pHM881QN 的质粒通过 ISAba14 及 IS91 作用发生了 DNA 反向重组^[13]。

*bla*_{NDM-1} 基因的上游序列(1~13 099 bp)含有 Tn3 转座子、I 型整合子及其携带的“镶嵌拼接区(mosaic plasmid structure)”,此区域除了含有实现其自身功能的转座酶、解旋酶和整合酶外,还含有一个高达 7 个耐药基因的庞大基因盒(*dfrA14-arr-2-cmlA7-blaOXA-10-aadA1-qacEdelta1-sul I*),分别介导对磺胺类、氨基糖苷类、利福平、季铵盐类、窄谱头孢菌素等耐药。通常 *bla*_{NDM-1} 的上游类似区域整合子携带的基因盒多为 2~5 个^[8, 11-12],而本组结果高达 7 个,说明此区域的高度可变性,可能此区域内发生多次 DNA 重组。携带耐药基因的细菌所耐抗菌药物中,部分药物虽与临床有关,但更多的药物与家禽养殖和环境消毒有关,如季铵盐类并不是临床使用的抗菌药物,仅用于食品工业和环境消毒,因其选择性压力,造成在零售的肉类等食品中检出率很高^[14];氯霉素、氨基糖苷类、利福平也是兽药的常见成分,推测本研究发现的由 I 型整合酶携带的超级耐药基因盒可能与食品工业和环境消毒滥用抗菌药物/消毒剂有关。

总之,产气肠杆菌 HN-NDM0711 多重耐药的原因是 IncA/C 型可转移性质粒携带的 *bla*_{NDM-1} 及一个庞大的耐药基因盒,此质粒可能来源于临床、农业和环境所使用的不同抗菌药物/消毒剂压力下的基因重组,因此,减少细菌耐药不仅要加强临床合理使用抗菌药物的管理,也应加强对工农业使用抗菌药物的控制,从源头上减少此类“超级细菌”的产生。

[参 考 文 献]

[1] King AM, Reid-Yu SA, Wang W, et al. Aspergillomarasmine A overcomes metallo- β -lactamase antibiotic resistance[J]. Nature, 2014, 510(7506): 503-506.
[2] Johnson AP and Woodford N. Global spread of antibiotic re-

sistance; the example of New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM)-mediated carbapenem resistance[J]. J Med Microbiol, 2013, 62(Pt 4): 499-513.

- [3] Poirel L, Dortet L, Bernabeu S, et al. Genetic features of *bla*_{NDM-1}-positive Enterobacteriaceae[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2011, 55(11): 5403-5407.
[4] 肖伟强,沈勇,潘军,等. 交叉感染引起的 3 株产 I 型新德里金属 β -内酰胺酶产气肠杆菌同源性检测[J]. 中华传染病杂志, 2014, 32(11): 670-672.
[5] Wang M, Tran JH, Jacoby GA, et al. Plasmid-mediated quinolone resistance in clinical isolates of *Escherichia coli* from Shanghai, China[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2003, 47(7): 2242-2248.
[6] Carattoli A, Bertini A, Villa L, et al. Identification of plasmids by PCR-based replicon typing[J]. J Microbiol Methods, 2005, 63(3): 219-228.
[7] Fu Y, Du X, Ji J, et al. Epidemiological characteristics and genetic structure of *bla*_{NDM-1} in non-*baumannii* *Acinetobacter spp.* in China[J]. J Antimicrob Chemother, 2012, 67(9): 2114-2122.
[8] Du H, Chen L, Chavda KD, et al. Genomic characterization of *Enterobacter cloacae* isolates from China that co-produce KPC-3 and NDM-1 carbapenemases[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(4): 2519-2523.
[9] Doublet B, Boyd D, Douard G, et al. Complete nucleotide sequence of the multidrug resistance IncA/C plasmid pR55 from *Klebsiella pneumoniae* isolated in 1969[J]. J Antimicrob Chemother, 2012, 67(10): 2354-2360.
[10] Chen Y, Zhou Z, Jiang Y, et al. Emergence of NDM-1-producing *Acinetobacter baumannii* in China[J]. J Antimicrob Chemother, 2011, 66(6): 1255-1259.
[11] Sarkar A, Pazhani GP, Chowdhury G, et al. Attributes of carbapenemase encoding conjugative plasmid pNDM-SAL from an extensively drug-resistant *Salmonella enterica* Serovar Senftenberg[J]. Front Microbiol, 2015, 15(6): 969-979.
[12] Mataseje LF, Boyd DA, Lefebvre B, et al. Complete sequences of a novel *bla*_{NDM-1}-harbouring plasmid from *Providencia rettgeri* and an FII-type plasmid from *Klebsiella pneumoniae* identified in Canada[J]. J Antimicrob Chemother, 2014, 69(3): 637-642.
[13] Lewin B. Gene VIII[M]. Oxford University Press, 2004.
[14] Zou L, Meng J, McDermott PF, et al. Presence of disinfectant resistance genes in *Escherichia coli* isolated from retail meats in the USA[J]. J Antimicrob Chemother, 2014, 69(10): 2644-2649.

(本文编辑:豆清娅)